

Bij ontslag uit het ziekenhuis

Het aërosolmasker en bijhorende leiding mag u meenemen naar huis (dit bevindt zich in de kamer van uw kind).

U kan een aërosoltoestel huren bij uw ziekenfonds of bij uw apotheek. Indien u lid bent van een bepaald ziekenfonds kunt u aan voordeeltarieven een aërosoltoestel huren.

Aërosolmedicatie kunt u kopen in de apotheek mits een voorschrift van een arts. Ventolin druppels krijgt u mee naar huis. De hoeveelheid toe te dienen medicatie kunt u steeds terugvinden op het ontslagformulier dat u meekrijgt bij ontslag uit het ziekenhuis.

Reinigen van de inhalator

Verwijder na elke verneveling de resterende vloeistof uit het reservoir om bacteriegroei te voorkomen. Reinig elke dag het reservoir door af te spoelen onder stromend water en te laten drogen aan de lucht. Het masker wordt gereinigd met lauw water en zeep. Steeds goed naspoelen en laten drogen aan de lucht.

Bewaring

De inhalatievloeistof niet blootstellen aan vrieskou of aan hoge temperaturen zoals direct zonlicht of een verwarmingstoestel.



www.azstlucas.be

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

campus Sint-Lucas
Groenebriël 1, 9000 Gent

campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent

tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be



Sint-Lucas

info



Vernevelaar

Toedienen van aërosol bij kinderen



Doel

De toediening van geneesmiddelen via inhalatie is de meest efficiënte techniek om longaandoeningen te behandelen. Via inhalatie kan u uw ademhalingsklachten voorkomen, beperken of opheffen. Het adequaat gebruiken van de inhalatie is fundamenteel voor het welslagen van uw therapie omdat het geneesmiddel rechtstreeks in de longen terecht komt. Op deze manier trachten we een zo hoog mogelijke afzetting van medicatie te bekomen in de juiste zones van de longen, met een snelle werking als gevolg.

Gebruik van de aërosol

1. Geef aërosol steeds voor de voeding om de kans op hoestbuien en braken te verminderen.
2. Sluit het mondmasker met de leiding aan op het toestel. Steek de stekker in het stopcontact.
3. De voorgeschreven medicatie doet u in het reservoir onderaan het masker (figuur 1).

4. Zorg ervoor dat uw kind tijdens de aërosol een comfortabele houding aanneemt: een rechtopzittende houding in de zetel, op de stoel of op uw schoot (figuur 2).
5. Plaats het masker op het gezicht van uw kind/baby. Zorg ervoor dat mond en neus zich onder het masker bevinden (figuur 3).
6. Zet het toestel aan. De verneveling is zichtbaar onder de vorm van damp.
7. Houd het masker met het reservoir steeds rechtop, zodat u een gelijkmatige nevel krijgt.
8. Indien uw kind zeer onrustig is, kan u hem/haar troosten door een fopspeen te geven tijdens de aërosol.
9. Na vijftien minuten mag u de verneveling stoppen. Zet het toestel uit en verwijder het masker van de mond.
10. Laat uw kind na aërosol een beetje drinken om de mond te spoelen (laat jonge kinderen/baby's drinken, oudere kinderen kunnen hun mond spoelen met water). Zo blijft er geen medicatie achter in de mond.
11. Reinig elke dag het masker en het reservoir.



figuur 1



figuur 2



figuur 3