

▶ Waar moet uw bezoek op letten?

Aan de kamerdeur hangt een isolatiekaart om de aandacht van uw bezoek te vestigen op het besmettingsrisico en de te nemen maatregelen.

Uw bezoek wordt gevraagd:

- Bij het verlaten van de kamer altijd goed de handen te ontsmetten met handalcohol.
- Het sanitair in uw kamer niet te gebruiken.
- Na het bezoek aan u geen andere patiënten meer te bezoeken in het ziekenhuis.
- Indien uw bezoek instaat voor de verzorging van nog een zieke of verzwakte persoon, dan moeten zij een schort en handschoenen dragen.

▶ Heropname in AZ Sint-Lucas

Bij heropname in ons ziekenhuis blijven we u als drager van CPE beschouwen en wordt u opnieuw in isolatie verzorgd om besmetting van andere patiënten te voorkomen. We screenen u dan opnieuw. Wanneer drie opeenvolgende controles negatief zijn, gaan we ervan uit dat u geen drager meer bent van CPE.

▶ Nog vragen?

Contacteer de dienst infectiepreventie op 09 224 63 04.

CPE en infectiepreventie

BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen)



CPE

en infectiepreventie

▶ Wat is CPE?

CPE staat voor Carbapenemase Producerende Enterobacteriën. Enterobacteriën behoren tot de normale darmflora van mens en dier. Als deze goedaardige bacteriën op andere plaatsen in het lichaam komen te zitten zoals urineblaas, wonden, ... kunnen ze bij personen met een verzwakte weerstand een infectie veroorzaken.

CPE maken eiwitten aan die carbapenem-antibiotica afbreken. Carbapenems zijn antibiotica die gebruikt worden om ernstige infecties te behandelen. CPE behoort dus tot de groep bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Het dragen van CPE is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, het gaat ook niet gepaard met ziekteverschijnselen. Bij ernstig zieke patiënten kunnen CPE wel een infectie veroorzaken.

▶ Hoe wordt CPE overgedragen?

Bij het innemen van bepaalde antibiotica kunnen de resistente bacteriën die in de darm van nature in kleine aantallen aanwezig zijn, overleven en zich verder vermenigvuldigen. De bacteriën kunnen ook van de ene persoon op de andere overgedragen worden via de handen of via de omgeving.

▶ Hoe gebeurt de vaststelling van CPE?

Indien daar redenen voor zijn, gebeurt er een staalafname met een wisser (soort wattenstaafje) ter hoogte van het rectum (darm). Dit noemt men screenen. Deze screening wordt uitgevoerd in het begin van uw ziekenhuisopname en wordt herhaald bij langdurig verblijf of transfer naar een andere afdeling.

▶ **Welke maatregelen neemt het ziekenhuis?**

Als in het laboratorium vastgesteld wordt dat u drager bent van CPE worden extra voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding naar andere patiënten te voorkomen:

- U verblijft in een éénpersoonskamer of deelt een kamer met andere CPE patiënten (dit brengt geen extra kosten met zich mee).
- De ziekenhuismedewerkers en artsen dragen een beschermerschort en handschoenen indien zij contact hebben met u of uw omgeving (bed, nachttafel, lavabo,...).
- Wanneer u uw kamer dient te verlaten voor een onderzoek of behandeling, moet u uw handen ontsmetten met handalcohol (alcoliquid 77%, flacon aanwezig in de kamer).

▶ **Hoe wordt CPE behandeld?**

Uw behandelende arts volgt samen met het team infectiepreventie uw toestand op. Bij ernstig zieke patiënten kunnen CPE een infectie veroorzaken. In dat geval zal de behandelende arts na overleg de best mogelijke behandeling instellen om deze infectie te bestrijden.

▶ **Hoe kunt u helpen?**

Blijf op uw kamer. Enkel voor onderzoek of behandeling mag u uw kamer verlaten.

Pas goede handhygiëne toe, dit wil zeggen dat u uw handen wast en droogt minstens:

- Als de handen zichtbaar vuil zijn
- Voor de maaltijd
- Na toiletgebruik
- Na hoesten, niezen of snuiten