

INWENDIGE BESTRALING VAN DE BAARMOEDER

plaatsing van applicator onder verdoving

INWENDIGE BESTRALING VAN DE BAARMOEDER

plaatsing van de applicator onder verdoving

Binnenkort ondergaat u een behandeling met **brachytherapie** waarbij de applicator onder algemene verdoving wordt ingebracht. Deze folder geeft u meer informatie over wat brachytherapie inhoudt en hoe de behandeling precies verloopt.

► Wat is brachytherapie?

Brachytherapie is een inwendige bestraling m.a.w. de bestralingsbron wordt in een lichaamsholte (de baarmoeder) ingebracht. 'Brachy' betekent 'korte afstand', dus de bestraling gebeurt op een korte afstand van de applicator (welke zich in de baarmoeder bevindt). Deze behandeling wordt vaak voorafgegaan door een uitwendige bestraling in combinatie met een wekelijkse toediening van chemotherapie.

De applicator wordt ingebracht tijdens een korte algemene verdoving. In totaal zullen vier inwendige bestralingen

gebeuren welke gespreid worden over twee opnames (twee behandelingen per opname).

Er is een opname voorzien van twee nachten, meestal van dinsdagavond tot donderdagmiddag:

Dinsdagavond worden de preoperatieve zorgen gegeven.

Woensdagmiddag wordt de applicator geplaatst onder verdoving en volgt de eerste behandeling.

Donderdagochtend volgt de tweede bestraling met nadien verwijdering van de applicator en ontslag.

Uitzonderlijk gebeurt de verwijdering onder een tweede korte verdoving. Deze procedure herhaalt zich een week later.

▶ Opnameverloop

De dag van de opname dient u zich eerst in te schrijven in straat 60. Nadien begeeft u zich naar de verpleegafdeling (meestal straat 47).

Vorbereiding

Breng volgende zaken mee voor de behandeling/opname:

- identiteitskaart
- slaapkleedje, toiletgerief, e.d.m.
- uw medicatie
- verstrooiing (boek, pc,...)

De verdere voorbereiding houdt het volgende in:

- overlopen ingevulde vragenlijst MRI
- licht verteerbare voeding tot 24u (nadien nuchter)
- scheren gynaecologische streek
- eventueel toedienen van premedicatie
- darmlediging

Verloop

De plaatsing gebeurt door de radiotherapeut-oncoloog en de gynaecologische oncoloog in de operatiezaal tijdens een korte verdoving. Er wordt ook een blaaskatheter ingebracht. De applicator wordt nadien met kleefpleisters gefixeerd, u blijft na plaatsing in rugliggen en vanaf nu blijft u in bed.

Indien u voldoende wakker en stabiel bent, wordt u naar straat 21 gebracht voor een MRI onderzoek. Aaneensluitend wordt u in bed naar straat 51 vervoerd waar een CT-scan wordt genomen. Deze onderzoeken zijn nodig om een correct behandelingsplan te kunnen opstellen.

Na de dosisberekening wordt de applicator door de arts aangesloten op het bestralingstoestel waarin zich de stralingsbron bevindt. De arts deelt u mee hoelang de bestraling duurt (gemiddeld een tiental minuten).

Wanneer de bestraling wordt gestart, blijft u eventjes alleen in de kamer. Er is een bel waarmee u de verpleging kunt bereiken en tijdens de behandeling zien wij u via een camera.

Van de bestraling zelf voelt u niets. U hoort een signaal om het begin van de bestraling aan te geven en tijdens de bestraling hoort u een licht zoemend geluid. Blijf tijdens de bestraling vooral rustig liggen en probeer zo weinig mogelijk te bewegen.

Het is van belang om tussen de beide behandelingen (24 uur) rustig in ruglig in bed te blijven. De applicator blijft immers zo lang in de baarmoeder achter. Er wordt licht verteerbare voeding voorzien. De tweede dag van elke behandeling gebeurt vooraf nog een controle CT-scan vooraleer de tweede bestraling wordt gestart.

Ontslag

Na de bestraling verwijdert de arts de applicator en de verpleegkundige de blaassonde en kleefpleisters. U krijgt nog een vaginale spoeling en blijft nog even op de kamer ter observatie.

▶ **Nazorg**

Volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- pijn bij het plassen
- vaginale irritatie
- huidirritatie

De eerste dagen na de bestraling worden vaginale spoelingen aanbevolen. U krijgt hiervoor een attest voor de thuisverpleging. U kunt dit ook zelf uitvoeren. Vraag raad aan de verpleegkundige.

We raden u aan om in de week na elke behandeling voldoende te drinken om blaasinfecties te vermijden.

Een consultatie bij de radiotherapeut-oncoloog wordt gepland ongeveer vier weken na de inwendige bestraling. De verdere opvolging gebeurt in principe door uw vertrouwde gynaecoloog.

Bij ontslag worden u alle documenten en afspraken meegegeven

Bij vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de dienst radiotherapie: 09 224 66 25.

Contact

Dienst radiotherapie

Straat 51

T 09 224 66 20

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent

T 09 224 61 11
E info@azstlucas.be