

Goed om weten

- ◆ Er wordt niet behandeld op een gebruikte huid. Een goede bescherming tegen de zon is vereist van zes weken vóór tot zes weken na de behandeling.
- ◆ Om zeker te zijn van een goede werking of om het risico op bijwerkingen in te schatten, kan in sommige gevallen eerst een kleine zone behandeld worden. We spreken van een proefbehandeling.
- ◆ Het effect van de behandeling wordt beoordeeld na zes weken. De tijd tussen twee opeenvolgende sessies bedraagt dus minstens zes weken.
- ◆ Er is meestal geen tussenkomst door het ziekenfonds.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u ons elke werkdag bereiken op het secretariaat huidziekten, straat 53, tel. 09-224 64 26.



> Vaatlaser

IPL StarLux Rs (650-1200 nm)

Dienst huidziekten

2016/18.842

www.azstlucas.be

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent

campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent

tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be





Wat is vaatlaserbehandeling?

De vaatlaser wordt gebruikt om oppervlakkige bloedvaten te verwijderen.

Een vaatlaser produceert licht met grote energie dat wordt geabsorbeerd door oxyhemoglobine (de zuurstoftransporter in het bloed). De energie wordt omgezet in warmte en zorgt voor het dichtschroeien van het bloedvat. Afhankelijk van de hoeveelheid energie en de tijdsperiode waarin deze wordt vrijgegeven, worden grotere of kleinere vaten getroffen. Het licht wordt weinig geabsorbeerd door omliggende huidstructuren zodat deze niet beschadigd worden.

Verschillende huidaandoeningen gaan gepaard met een stoomis in de bloedvaten waardoor deze abnormaal uitgezet of talrijk zijn. Het gaat onder andere om rosacea of couperose, spider naevi, wijnvlekken, angiomen en littekens. De vaatlaser verwijdert de oppervlakkige vaatjes en kan zo bepaalde letsels volledig verwijderen, andere verbeteren.

Op onze dienst hebben we twee types vaatlaser: een IPL StarLuxG (500-670 en 870-1400nm) en een KTP laser (532nm). Ze hebben elk hun eigen indicaties.

Beperkingen vóór of na de behandeling

- ◆ Op het moment van de behandeling mag u niet gebruid zijn (door de zon of zonnebank). Bij een teveel aan bruin pigment in de huid bestaat het gevaar dat de behandelde zone geneest met een te lichte of te donkere kleur. Meestal vervaagt dit kleurverschil in de loop van enkele maanden, maar soms is het blijvend. We raden dan ook aan om gedurende zes weken vóór de behandeling blootstelling aan de zon te vermijden.
- ◆ Ook na de behandeling is het belangrijk om uw huid gedurende zes weken te beschermen tegen de zon. Dit kan door gebruik van een zonnecrème met een beschermingsfactor van minstens 30. Gebruik deze het liefst meerdere keren per dag.
- ◆ Meld steeds uw medicijngebruik aan de behandelende arts. Sommige medicijnen kunnen een lichtovergevoeligheid geven. In combinatie met laserlicht bestaat het gevaar op blaarvorming en littekens.
- ◆ Er mogen geen ontstekingen (zoals een koortsblaas) of open wonden zijn in de te behandelen zone.
- ◆ Voor de behandeling moet de huid vrij zijn van crème en make-up.
- ◆ Er wordt niet behandeld tijdens zwangerschap.

Verloop van de behandeling

- ◆ Tijdens de behandeling krijgt u een beschermende bril omdat het laserlicht oogbeschadiging kan veroorzaken. Er worden nog lichtflitsen gezien, deze zijn niet schadelijk.
- ◆ Soms wordt een olie of gel aangebracht om het laserlicht optimaal naar de huid te geleiden.
- ◆ De behandeling is gevoelig tot licht pijnlijk. Het voelt als een elastiekje dat tegen de huid aan schiet of als speldenprikken.

- ◆ Onmiddellijk na de behandeling ontstaat meestal roodheid en zwelling van de huid. Dit gaat gepaard met een branderig gevoel. Er wordt gebruik gemaakt van ice packs of koude kompressen om het zwellen tegen te gaan.
- ◆ Tot slot wordt een verkoelende gel of crème aangebracht.

Na de behandeling

- ◆ De zwelling en de roodheid verdwijnen meestal in de loop van twee dagen. Koude kompressen kunnen helpen om het zwellen tegen te gaan.
- ◆ Na behandeling van het gelaat kan u de eerstvolgende nacht bij het slapen het hoofdeinde van het bed verhogen (vb. meerdere hoofdkussens).
- ◆ Het is nuttig om de huid een drietal keren per dag in te smeren met een herstellende crème.
- ◆ In enkele gevallen kunnen puntvormige bloedingen of kleine blaren ontstaan. Deze genezen in de week volgend op de behandeling en laten geen littekens na.
- ◆ Het aanbrengen van make-up mag vanaf de eerste dag na de behandeling.
- ◆ Cosmetische producten die de huid kunnen irriteren (zuren, scrubs, ...) zijn te vermijden.
- ◆ Tot één week na de behandeling worden activiteiten die de huiddoorbloeding stimuleren (sporten, sauna, hete baden) afgeraden.
- ◆ Een goede bescherming tegen de zon wordt aangeraden tot zes weken na de behandeling.
- ◆ Het effect van de behandeling wordt best beoordeeld na zes weken. In bepaalde gevallen moet meerdere keren behandeld worden om een zichtbaar resultaat te bekomen.
- ◆ De vaatlaser heeft geen invloed op de ontwikkeling van nieuwe letsels.