

DEKOLONISATIE bij MRSA-dragerschap



DEKOLONISATIE bij MRSA-dragerschap

▶ MRSA

Er werd vastgesteld dat u drager bent van MRSA. **M**ethicilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus (MRSA) is een bacterie die ongevoelig is voor de meest voorgeschreven antibiotica en kan zowel op de huid voorkomen als in de neus, keel, darmen en urine.

Uw behandelende arts heeft samen met het team infectiepreventie besloten dat het zinvol is om deze bacterie bij u te verwijderen (= “dekolonisatie”). Deze dekolonisatie gebeurt met behulp van een ontsmettende zeep, samen met het aanbrengen van een MRSA dodende neuszalf en een keelspoeling.

In deze folder vindt u de nodige instructies om de dekolonisatie thuis op te starten of om de behandeling af te ronden indien deze reeds in het ziekenhuis werd gestart. U krijgt hiervoor het nodige voorschrift van uw behandelende (huis)arts.

▶ Behandelingsschema

De behandeling wordt gedurende **vijf dagen aangehouden**.

1. Aanbrengen van Bactroban® neuszalf

- 3 x dag, gedurende vijf dagen.
- Breng met een wattenstaafje een hoeveelheid Bactroban® neuszalf ter grootte van een luciferkopje aan in beide neusgaten, vooraan in de neus (“neuspeutergebied”).

2. Wassen van de huid met Hibiscrub®

- 1 x dag, gedurende vijf dagen.
- Vervang tijdens het wassen uw gewone zeep door Hibiscrub®. Douchen is zeker mogelijk.
- Gebruik dagelijks een vers washandje en handdoek.
- Wrijf uw lichaam in van nek tot voeten. Vermijd contact met gelaat (ogen) en genitaliën.
- Spoel nadien uw lichaam af met water

Dag 1	Bactroban® + Hibiscrub® + Corsodyl®
Dag 2	Bactroban® + Hibiscrub® (+haar wassen) + Corsodyl®
Dag 3	Bactroban® + Hibiscrub® + Corsodyl®
Dag 4	Bactroban® + Hibiscrub® (+haar wassen) + Corsodyl®
Dag 5	Bactroban® + Hibiscrub® + Corsodyl®

en droog af.


- Was uw haar de tweede en vierde dag ook met Hibiscrub®.

3. Spoelen van de keel met Corsodyl® mondwater

- 3 x dag, gedurende vijf dagen.
- Spoel uw mond met Corsodyl® mondwater.
- Indien gorgelen niet goed lukt, gebruik Corsodyl® spray (= 12x sprayen per keer).

► Controlescreening

Om na te gaan of de behandeling effectief is geweest, kunt u zich tot uw huisarts wenden. Doe dit pas vanaf **de derde dag na het beëindigen van uw behandeling** (om een vals negatieve screening te vermijden). Neus, keel en rectum worden dan opnieuw gescreend met een wisser.



Pas wanneer in **drie opeenvolgende staalnames geen MRSA** wordt gevonden, is de behandeling geslaagd.

Indien u nog steeds drager bent, kan eventueel een tweede dekolonisatiepoging ondernomen worden.

► Waar let u op?

Bij **irritatie of opzwellen** van de slijmvliezen tijdens het gebruik van **één van deze producten** moet de behandeling **onmiddellijk stopgezet** worden. Verwittig uw behandelende arts of huisarts.

► Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt omtrent deze behandeling of als er nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om uw behandelende arts of het team infectiepreventie te contacteren.

Contact

Infectiepreventie

T 09 224 63 04

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent

T 09 224 61 11
E info@azstlucas.be

2017/21.833