

# VACCINATIES



# Informatiefolder voor predialysepatienten, dialysepatiënten en transplantpatiënten

## ► Inleiding

U lijdt aan chronische nierinsufficiëntie en wordt daarvoor opgevolgd door een van de nierspecialisten van ons centrum. Mensen met chronische ziekten hebben een verminderde weerstand tegen infecties. Daarnaast is er in de nabije of verdere toekomst een kans dat een nierfunctieervangende therapie noodzakelijk zal zijn (dialyse en/of transplantatie). Aangezien er in die situatie ook een verminderde afweer is (bv. ook bij transplantatie door de medicatie tegen afstoting), willen wij u al de nodige bescherming bieden door een vaccinatieschema, aangepast aan uw noden en uw situatie.

## ► Predialyse – Chronisch nierlijden

- Bij verdere achteruitgang van de nierfunctie en de voorbereiding op dialyse of transplantatie, wordt u best beschermd tegen **hepatitis B**. De vaccinatie bestaat uit 4 x 1 injectie Fendrix 0.5 (dag 0, na 1 maand, na 2 maand en na 6 maand). Daarna zal via een

bloedtest worden gecontroleerd of u nog een 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> injectie nodig heeft. Voor het onderhouden van de bescherming zal een laatste vaccinatie worden voorzien na 1 jaar.

## ► Dialyse

- Meestal zal u voor de start van dialyse al uw **hepatitis B** vaccinatieschema hebben doorlopen. Indien dit niet het geval is, wordt dit bij de start voorzien (zie schema hierboven). In de verdere opvolging zal driemaandelijks de vaccinatiestatus worden gecontroleerd bij de bloedafnames en zal een boost worden voorzien indien de spiegel te laag is.
- Jaarlijkse vaccinatie voor **griep** zal voorzien worden op dialyse en wordt gegeven door de huisarts.
- Ter bescherming voor **pneumokokkenlongontsteking** zal u ofwel vijfjaarlijks het Pneumo 23 vaccin krijgen ofwel eenmalig het Prevenar 13 vaccin.
- Verder is het aan te raden om de 10 jaar de **tetanus** vaccinatie te herhalen.

| WIE               | WAT  | SCHEMA  |
|-------------------|--|---|
| <b>DIALYSE</b>    | • Hepatitis B (Fendrix 0,5)                          | • 4×1 injectie (0-1-2-6 maand)<br>• Zo nodig 2×1 injectie (7-8 maand)<br>• Boost na 1 jaar<br>• Boost afhankelijk van bloedresultaten |
|                   | • Griep (Influvac)                                   | • jaarlijks   |
|                   | • Pneumokok-longontsteking (Prevenar 13 / Pneumo 23) | • Prevenar 13 en 8 weken later Pneumo 23, dan Pneumo 23 eenmalig te herhalen na 5 jaar<br>• Ofwel Pneumo 23 en te herhalen na 5 jaar  |
|                   | • Tetanus (Tedivax of Boostrix)                      | • 10 jaarlijks  |
|                   | • Hepatitis B (Fendrix 0,5)                          | • Vóór transplantatie<br>• Zie schema dialyse   |
|                   | • Griep (Influvac)                                   | • jaarlijks   |
| <b>TRANSPLANT</b> | • Pneumokok-longontsteking (Prevenar 13 / Pneumo 23) | • Prevenar 13<br>• 8 weken later Pneumo 23<br>• Pneumo 23 te herhalen om 5 jaar   |
|                   | • Tetanus (Tedivax of Boostrix)                      | • 10 jaarlijks  |
|                   | • Gele koorts (Stamaril)                             | • Vóór transplantatie<br>• Bij planning/ mogelijkheid verre reizen in toekomst  |
|                   | • Rubella (Priotix of Vax pro)                       | • Vóór transplantatie<br>• Indien geen vaccinatie als kind (in België normaal in orde)  |

## ▶ Transplantatie

- Vaak zal u reeds in dialyse zijn en is de **hepatitis B vaccinatie** al doorlopen. Indien u echter nog niet in dialyse bent vóór de inschrijving op de transplantlijst, dan dient het vaccinatieschema alsnog te worden doorlopen (zie hoger bij predialyse).
- Jaarlijkse vaccinatie voor **griep** wordt ten sterkste aangeraden.
- Na transplantatie is een bescherming tegen **pneumokokken- longontsteking**

noodzakelijk, zeker gezien de afweerremmende medicatie die u zal innemen. De vaccinatie bestaat uit een eerste injectie met Prevenar 13 en 8 weken later een injectie Pneumo 23. Het laatste vaccin dient om de 5 jaar te worden vernieuwd.

- Verder is het aan te raden om de 10 jaar de **tetanus** vaccinatie te herhalen.
- Omwille van de noodzaak tot levenslange inname van afweerwerende medicatie na transplantatie, is het ook goed reeds

te kijken naar de toekomst. Indien u eventueel plannen zou hebben voor verre reizen naar tropische gebieden voorziet u best vóór transplantatie een vaccinatie tegen **gele koorts** aangezien dit niet meer kan gebeuren na transplantatie (het gaat immers om een levend afgezwakt vaccin). De vaccinatie is goed voor minstens 10 jaar, mogelijks zelfs levenslang.

- Ook het vaccin voor **Rubella** of rode hond kan niet worden gegeven na transplantatie. Bekijk dus goed uw vaccinatiestatus bij uw voorbereidingen tot inschrijving op de transplantlijst. In België worden normaal gezien alle kinderen tussen 1 en 2 jaar standaard hiervoor gevaccineerd.

## ► Contact

**Dr. J. Donck**

**Dr. V. Neiryck**

**Dr. C. Seghers**

**Dr. S. van Hooland**

**Dr. A. Wauters**

**Dialyse Gent**

T 09 224 65 58

**Secretariaat nierziekten**

T 09 224 65 50

**Algemeen nummer AZ Sint-Lucas**

T 09 224 61 11

*Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.*



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas  
Groenebriel 1  
9000 Gent

Campus Volkskliniek  
Tichelrei 1  
9000 Gent

T 09 224 61 11

E [info@azsintlucas.be](mailto:info@azsintlucas.be)

19.849

Laatste update: aug 2018