

An anatomical illustration of a human torso, rendered in a glowing blue color. The internal organs, including the lungs, heart, stomach, and small intestine, are visible. The large intestine is highlighted in a bright orange color, making it stand out from the rest of the body. The text is overlaid on the upper left portion of the torso.

COLOSCOPIE

met Picoprep[®] voor kinderen
met narcose


COLOSCOPIE

met Picoprep® voor kinderen (narcose)

► Uw kind ondergaat binnenkort een coloscopie

Uw arts heeft u de reden van dit onderzoek uitgelegd. Via deze brochure geven we u graag wat meer informatie over het verloop van het onderzoek en de voorbereiding ervan. Zo bent u goed ingelicht over wat er gaat gebeuren.

We vragen u deze brochure aandachtig te lezen. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt of indien u vergeten zou zijn om belangrijke informatie door te geven, kunt u ons contacteren via onze polikliniek in AZ Sint-Lucas (tel. 09 224 64 81).



► Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek van de dikke darm. In sommige gevallen wordt ook het uiteinde van de dunne darm bekeken. Dit gebeurt met een endoscoop, een soepel en stuurbaar buisje voorzien van een camera. Bij kinderen maken we gebruik van een speciaal aan hen aangepast toestel. Deze wordt via de anus ingebracht en voorzichtig over het verloop van de darm opgeschoven. Tijdens het onderzoek wordt lucht of CO₂ ingeblazen om de zichtbaarheid te verhogen en de darmwand glad te strijken. De arts krijgt op die manier een goed beeld van de binnenzijde van de darm. Na ieder onderzoek wordt de endoscoop zorgvuldig gereinigd en ontsmet volgens de geldende reglementeringen.

COLOSCOPIE

1. Flexibele slang (endoscoop)
2. Anus
3. Sigmoid
4. Endeldarm
5. Licht
6. Dikke darm
7. Blinde darm

Datum van het onderzoek:

Uur van het onderzoek:

Voorbereiding thuis: Daags voordien wordt u tussen 12u en 18u gecontacteerd door een medewerker om het juiste uur van opname mee te delen. Indien u om 18u nog geen telefoon hebt ontvangen, gelieve dan zelf contact op te nemen met ons via telefoonnummer 09 224 51 25.


Voorbereiding in ziekenhuis: U wordt verwacht op omu.....

Naam van de arts die het onderzoek zal verrichten:

► Doel van het onderzoek

De arts zal de binnenzijde van de darm zorgvuldig inspecteren. Op deze manier kunnen zweertjes, ontsteking, divertikels (uitstulpingen op de darm), poliepen, vernauwingen, gezwellen ... worden opgespoord. Eventueel worden kleine stukjes weefsel (biopten) genomen voor microscopisch onderzoek.

Er kunnen ook poliepen worden weggenomen, vernauwingen verbreed en bloedingen gestelpt.




Darmpoliep

► Risico's van het onderzoek

We beschikken over een ervaren team van artsen, verpleegkundigen en logistiek personeel en we zijn uitgerust met moderne infrastructuur. Iedere medische handeling, zelfs uitgevoerd in optimale omstandigheden, houdt evenwel potentiële risico's in.

In het geval van een coloscopie zijn deze complicaties zeldzaam.



Ontstoken dikke darm

Verwikkelingen zijn meestal tijdens het onderzoek reeds zichtbaar. Zo kan er een scheurtje (perforatie) in de darmwand optreden of een bloeding na het verwijderen van een poliep. In sommige gevallen kan dit al tijdens het verloop van de coloscopie worden opgelost, in zeldzame gevallen kan een operatie nodig zijn.

Om de darmwand beter zichtbaar te maken, wordt lucht ingeblazen wat na het onderzoek aanleiding kan geven tot wat krampen en winderigheid.

Er wordt een lichte vorm van anesthesie voorzien. Soms kan er na de narcose misselijkheid optreden. Er bestaat ook een geringe kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie.

Complicaties kunnen soms ook pas zichtbaar worden wanneer u thuis bent. De voornaamste symptomen zijn buikpijn, een grote hoeveelheid rood bloedverlies in de stoelgang of koorts. Wanneer u een of meerdere van deze symptomen herkent, contacteer dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.

► Voorbereiding van het onderzoek

Vooraleer het onderzoek kan worden uitgevoerd, moet de stoelgang uit de dikke darm worden verwijderd. Hoe beter de darm gereinigd is, hoe beter het onderzoek kan worden verricht. Het is dan ook essentieel dat de voorbereiding zorgvuldig gebeurt. In overleg met uw arts wordt beslist of de voorbereiding thuis of in het ziekenhuis gebeurt. Indien u de voorbereiding thuis dient te doen, kunt u het product om de darmen te reinigen (Picoprep®) in de apotheek halen zonder voorschrift.

Vanaf 2 dagen vóór het onderzoek:

Vermijd vezel- en pitrijk voedsel zoals groenten, fruit of fruitsap met pulp. Ook volle graanproducten, granenbroden en vezelrijke zaken worden best vermeden.


De dag vóór het onderzoek (indien de voorbereiding thuis gebeurt):

's Middags geeft u uw kind de **laatste vezelarme warme maaltijd**. Omstreeks 17u kan uw kind nog een lichte of vloeibare maaltijd innemen (pudding, yoghurt, bouillon ...). Maak nadien de oplossing voor de darmspoeling klaar: Los het eerste zakje Picoprep® op in een glas fris plat water en meng goed gedurende 2 à 3 minu-

ten. Laat deze oplossing opdrinken. Hierna moet er heldere vloeistof (plat water, appelsap, bouillon, heldere sportdrink...) gedronken worden om te spoelen. De hoeveelheid vloeistof die gedronken moet worden, vindt u in de tabel hieronder (aan een snelheid van 1 glas per 15 minuten).

De dag van het onderzoek (indien de voorbereiding thuis gebeurt):

Los het tweede zakje Picoprep® op in een glas fris water en meng goed gedurende 2 à 3 minuten. Deze oplossing moet opgedronken worden. Daarna moet opnieuw heldere vloeistof gedronken worden. De hoeveelheid hiervan vindt u terug in de tabel hieronder. Nadien dient de ontlasting helder te zijn. Indien dit niet zo is, moet er nog heldere vloeistof gedronken worden.



Goed gereinigde darm



Slecht gereinigde darm

Na inname van de laatste vloeistof moet er minstens 3 uur zijn verstreken alvorens de narcose veilig kan starten. **Drie uur voor het onderzoek mag uw kind niets meer drinken.**

Hoeveelheid heldere vloeistof die gedronken moet worden (1 glas per kwartier):

Leeftijd	1 ^e dosis Picoprep®		2 ^e dosis Picoprep®	
	Picoprep®	Heldere vloeistof	Picoprep®	Heldere vloeistof
1-2 jaar	1 maatlepel (50 ml)	½ liter	1 maatlepel (50 ml)	½ liter
2-4 jaar	2 maatlepels (100 ml)	1 liter	2 maatlepels (100 ml)	1 liter
4-9 jaar	1 zakje (150 ml)	1,5 tot 2 liter	2 maatlepels (100 ml)	1 liter
>9 jaar	2 zakjes (150 ml)	1,5 tot 2 liter	1 zakje (150 ml)	1,5 tot 2 liter



- Bezoek onze kinderwebsite
<http://lucas.azstlucas.be>
en bereid uw kind voor op
zijn/haar ziekenhuisbezoek!

Op het afgesproken tijdstip dient u zich aan te melden aan de opnamebalie in straat 60. Hier zal men de administratieve formaliteiten in orde maken. Nadien wordt u doorverwezen naar het onthaal van de kinderafdeling of het dagziekenhuis. De verpleegkundige van de afdeling helpt u dan verder met de voorbereiding voor het onderzoek.

► Verloop van het onderzoek

Uw kind wordt in een bed naar de onderzoeksruimte gebracht. Een saturatiemeter wordt aangebracht op de vinger om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten en om de hartslag te volgen. Nadien wordt een zuurstofmasker opgezet om extra zuurstof te kunnen geven tijdens het onderzoek.

Er wordt een infuus geplaatst om verdovende medicatie te kunnen toedienen.

Nadien valt uw kind in slaap en wordt het onderzoek verricht. De duur kan variëren, maar schommelt meestal rond de 30 minuten.

► Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt uw kind wakker in de ontwaakkamer waar het van nabij gevolgd wordt. Indien uw kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de kamer gebracht. Tenslotte komt de arts bij u langs om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

De verpleegkundigen zullen u melden wanneer uw kind terug naar huis kan. In principe kan uw kind bij thuiskomst een gewone maaltijd gebruiken. 's Anderendaags zijn de normale activiteiten mogelijk.

▶ Wat brengt u mee?

- Identiteitskaart.
- Kaart van de hospitalisatieverzekering (eventueel).
- De ingevulde vragenlijst van de dienst anesthesie.
- Toestemmingsformulier met handtekening en vermelding “gelezen en goedgekeurd”.
- Lijst van alle medicatie die uw kind inneemt.
- Comfortabele kledij.

Wat afleiding (lectuur, speelgoed, tablet...) is welkom omdat wachten op het onderzoek lang kan lijken. TV is op de kamer aanwezig.

▶ Geneesmiddelengebruik en andere belangrijke medische gegevens

Verwittig uw arts minstens één week voor het onderzoek bij:

- Gekende allergie
- Aanwezigheid van een kunsthartklep
- Bloedstillingsproblemen
- Het gebruik van bloedverdunners (o.m. Cardioaspirine®, Asaflow®, Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Brilique®, Ticlid®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Fragmin®, Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep®...)

Contact

Secretariaat maag-, darm- en leverziekten

Straat 98

T 09 224 64 81

E secretariaat.gastroSL@azstlucas.be

Dagziekenhuis

Straat 77

T 09 224 51 27

Artsen

dr. Ercan Cesmeli

dr. Frederik de Clerck

dr. Denis Marichal

dr. Walter Pauwels

prof. dr. Harald Peeters

dr. Sofie Rogge

dr. Beatrijs Strubbe

dr. Johan Van Ongeval

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas ziekenhuis Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas

Groenebriel 1

9000 Gent

Campus Volkskliniek

Tichelrei 1

9000 Gent

T 09 224 61 11

E info@azstlucas.be

21.522

Laatste update: maa 2020