

Contact

- Secretariaat drs. Balliu, Coetsier, Delanote, Merchiers en Van Renterghem 09-224 63 92
- Secretariaat drs. Beghin, Martens, Onghena, Vereecke, Volckaert, Yüksel en Zweers 09-224 63 80
- Secretariaat Drs. De Gezelle, Wirawan 09-224 63 88
- Secretariaat Drs. Debruynne 09-224 63 81
- Secretariaat Drs. Verpoest, Loobuyck 09-224 63 82



www.azstlucas.be

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent

campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent

tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be



Sint-Lucas

info



> Baarmoederhals- uitstrijkjes

Opsporen van humaan papilloma virus





Beste mevrouw, beste juffrouw,

Vandaag nam ik bij u een baarmoederhalsuitstrijkje af. Dit uitstrijkje dient als preventief onderzoek voor baarmoederhalskanker. Het doel is het opsporen van afwijkingen (= afwijkende cellen in de opperste lagen van de baarmoederhals). Er wordt met een borsteltje over het slijmvlies van de baarmoederhals gestreken en die cellen worden onderzocht onder de microscoop in het laboratorium voor anatomopathologie.

Bij **normale bevindingen** hoort u hier verder niets over.

Is het **uitstrijkje afwijkend**, dan is het in bepaalde gevallen aangewezen om op datzelfde uitstrijkje de aanwezigheid van het humaan papilloma virus (HPV) na te gaan.

Wat is een infectie met humaan Papillomavirus (HPV)?

Bij jonge vrouwen die seksueel actief zijn, is een HPV- infectie zeer frequent. De kans dat een vrouw ooit in haar leven een HPV-infectie oploopt, is 80 %. De grote piek van besmetting ligt tussen 18-35 jaar.

De meeste vrouwen komen de infectie vanzelf te boven, net zoals bij een verkoudheid. Het eigen afweersysteem (het immuunsysteem) zal in de meeste gevallen geïnfecteerde cellen opruimen. De gemiddelde duur van een HPV-infectie is tussen de 8 tot 12 maanden.

U hoeft zich dus niet meteen ongerust te maken als er bij u een HPV-infectie wordt vastgesteld.

Verband tussen een HPV- infectie en baarmoederhalskanker

Slechts een klein deel (1%) van alle vrouwen die een HPV-infectie hebben, zal in de loop der jaren baarmoederhalskanker ontwikkelen. Alleen bij vrouwen bij wie het virus langdurig aantoonbaar blijft, is er een verhoogd risico.

De ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker is een langdurig proces, zodat er voldoende tijd is om in te grijpen. De voorstadia van baarmoederhalskanker zijn goed behandelbaar, zonder dat het effect heeft op de vruchtbaarheid of het seksueel functioneren.

Belang van HPV- typering

Van dit virus bestaan meer dan 100 types. Enkele ervan kunnen een uitlokkende factor zijn voor de latere ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Wanneer een uitstrijkje een afwijkend resultaat vertoont, wordt er een bijkomende test gedaan, namelijk een HPV- typering.

Bij bepaalde HPV-types is het risico op evolutie naar kanker immers redelijk groot. Dit zijn de “hoog-risico” types. Vandaar het belang van een HPV- typering.

De uitslag van een HPV-typering is meestal binnen de 2 weken gekend en kan belangrijk zijn voor een beslissing omtrent de verdere behandeling.

1. Bij een afwijkend uitstrijkje zonder aanwezigheid van een “hoog-risico”-HPV type is een afwachtende houding aangewezen en wordt u pas na 1 jaar voor een nieuwe controle verwacht.
2. Bij een afwijkend uitstrijkje mét aanwezigheid van een “hoog risico”-virus is verder onderzoek aangewezen. In dit geval neem ik contact op om dit met u af te spreken. Binnen de maand mag u bericht van mij verwachten.

Kostprijs HPV-typering

Tot heden is voor deze bijkomende test geen terugbetaling door het ziekenfonds voorzien. De extra kostprijs voor het aantonen van HPV-virussen in een afwijkend uitstrijkje bedraagt 30 euro. Indien ook een identificatie van specifieke “hoog-risico” types nodig is, bedraagt de kostprijs 50 euro. Deze facturatie volgt via het ziekenhuis.

Er wordt bij het ministerie van Volksgezondheid aangedrongen door meerdere specialistenverenigingen (waaronder de gynaecologenvereniging) om zo snel mogelijk terugbetaling van die test te verkrijgen, zodat u die factuur niet meer toegestuurd krijgt.

Als vrouwenarts vind ik deze test uiterst zinvol om u degelijk op te volgen of te behandelen.

U bent natuurlijk altijd vrij deze bijkomende test (HPV-typering) te weigeren, maar dan zou u mijn secretariaat daar zeker van op de hoogte moeten brengen.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

De vrouwenartsen/gynaecologen van het AZ Sint-Lucas