

Allergietesten

Dienst huidziekten

Allergietesten

Op de dienst huidziekten worden twee soorten allergietesten uitgevoerd:

- Plaktesten
- Priktesten

Bij elk type test wordt de huid in contact gebracht met een bepaalde stof om een huidreactie uit te lokken en zo een eventuele allergie te bevestigen.

Plaktesten (epicutane testen)

Verloop

U komt drie keer op consultatie in een week:

- Op dag 1 (maandag of dinsdag) worden met speciale kleefpleisters producten op de rug en eventueel de bovenarmen aangebracht.
- Op dag 2 (woensdag of donderdag) worden de pleisters verwijderd en leest de arts het voorlopige resultaat af.
- Op dag 3 (donderdag of vrijdag) kunnen we het definitieve resultaat aflezen omdat de huid meerdere dagen nodig heeft om te kunnen reageren (vertraagd type allergie).

De arts bespreekt met u het resultaat van de testen en u krijgt een behandelingsadvies.

Aandachtspunten

- Breng geen voedende crème of zalf aan op de rug en armen op de eerste dagen van het onderzoek.
- Vanaf twee dagen voor de test mag u geen cortisonecrème of -zalf meer aanbrengen op de rug en armen.
- Geef altijd aan uw behandelend arts door welke medicatie u neemt. Eventueel moet de medicatie enkele dagen voor de testen stopgezet worden.
- Bij sterke beharing wordt de rug best twee dagen op voorhand geschoren.
- Ga niet zonnebaden of onder de zonnebank vanaf 6 weken voor de testdatum.
- Tijdens de testweek mag de rug niet nat worden (niet zwemmen, douchen, baden, intensief sporten). U mag zich wassen zolang uw rug niet nat wordt.
- Breng op de eerste dag van de testen (maandag of dinsdag) uw eigen producten mee in de originele verpakking (zalf, crème, zeep, shampoo, vochtige doekjes, make-up ...).

Priktesten

Verloop

Op de binnenzijde van uw armen wordt een druppel vloeistof aangebracht. Daarna wordt de huid doorheen de druppel aangeprikt. Na 20 minuten kan de arts de testen aflezen.

Aandachtspunten

- Voor testen met voeding vragen we u om van elk product een klein vers stukje mee te brengen. Voor vaste voeding volstaat een stukje van 1 op 1 cm, voor vloeistof volstaat 0,5 dl. De voeding mag niet gekookt zijn en elk stukje moet apart verpakt zijn.
- Als u ook een afspraak hebt voor plaktesten, dan gebeuren de priktesten bij uw laatste afspraak.
- U moet vijf dagen op voorhand stoppen met antihistaminica en minstens vier weken op voorhand met ketotifen (Zaditen®).

Algemene aandachtspunten

- Breng op de eerste dag van de testen uw eigen producten mee.
- We nemen geen allergietesten af tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
- Sommige medicatie kan de resultaten van de testen beïnvloeden. Verwittig uw arts wanneer de afspraak gemaakt wordt, als u één van de volgende middelen neemt:
 - Corticoïden
 - Antihistaminica:
 - Zyrtec® (cetirizine), Xyzall® (levocetirizine), Aerius® (desloratadine), Claritine® (loratadine), Estivan® (ebastine), Fenistil® (dimentideen), Zaditen® (ketotifen), Mizollen® (mizolastine), Telfast®, Allegratab® (fexofenadine), Atarax® (hydroxyzine), Rupatal® (rupatadine), Bellozal® (bilastine)

Gelieve tien dagen op voorhand te verwittigen als u uw afspraak niet kunt nakomen. Sommige producten worden namelijk speciaal voor u besteld. Bij laattijdig afbellen, worden die producten aangerekend.

Contact

Secretariaat huidziekten

Straat 53

T 09 224 64 26

artikel 24.716 | Laatste update: augustus 2021

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.