

Dekolonisatie bij MRSA-dragerschap



Dekolonisatie

bij MRSA-dragerschap

MRSA

We stelden vast dat u drager bent van MRSA. **M**ethicilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus (MRSA) is een bacterie die ongevoelig is voor de meest voorgeschreven antibiotica en kan zowel op de huid voorkomen als in de neus, keel, darmen en urine.

Uw behandelend arts heeft samen met het team infectiepreventie besloten dat het zinvol is om de bacterie bij u te verwijderen. Dat noemen we dekolonisatie. Dat gebeurt met een ontsmettende zeep, een MRSA-dodende neuszalf en een keelspoeling.

In deze brochure vindt u de nodige instructies om de dekolonisatie thuis op te starten of om de behandeling af te ronden als ze al in het ziekenhuis werd gestart. U krijgt het nodige voorschrift van uw behandelend (huis)arts.

Behandelingschema

De behandeling duurt vijf dagen.

1. Bactroban® neuszalf aanbrengen

Drie keer per dag, gedurende vijf dagen.

- Breng met een wattenstaafje een hoeveelheid Bactroban® neuszalf (de grootte van een luciferkopje) aan in beide neusgaten, vooraan in de neus ("neuspeutergebied"). Masseer de neusvleugels zodat de zalf zich verder verspreid. Was daarna uw handen.

2. De huid wassen met Hibiscrub®

Eén keer per dag, gedurende vijf dagen.

- Vervang tijdens het wassen uw gewone zeep door Hibiscrub®. Douchen is zeker aan te raden.
- Gebruik dagelijks een vers washandje en handdoek.
- Zeep uw lichaam in van nek tot voeten. Vermijd contact met gelaat (ogen) en genitaliën.
- Spoel uw lichaam af met water en droog af.

Was uw haar de tweede en vierde dag ook met Hibiscrub®.


Smeer de huid van baby's en kinderen na elke wasbeurt in met een voedende lichaamsmelk. Dit is ook aan te raden bij volwassenen met een droge huid.

Dag 1	Bactroban®/Fucidin®/Cetavlex® (3x) + Hibiscrub® (1x) + Corsodyl® (3x)
Dag 2	Bactroban®/Fucidin®/Cetavlex® (3x) + Hibiscrub® (1x) & haar wassen + Corsodyl® (3x)
Dag 3	Bactroban®/Fucidin®/Cetavlex® (3x) + Hibiscrub® (1x) + Corsodyl® (3x)
Dag 4	Bactroban®/Fucidin®/Cetavlex® (3x) + Hibiscrub® (1x) & haar wassen + Corsodyl® (3x)
Dag 5	Bactroban®/Fucidin®/Cetavlex® (3x) + Hibiscrub® (1x) + Corsodyl® (3x)

3. De keel spoelen met Corsodyl® mondwater

Drie keer per dag, gedurende vijf dagen.

- Spoel uw mond met Corsodyl® mondwater.
- Als gorgelen niet goed lukt, gebruik Corsodyl® spray (= 12 keer sprayen per keer).



Controlescreening

Om na te gaan of de behandeling effectief was, kunt u zich tot uw huisarts wenden. Doe dat pas vanaf de derde dag na de behandeling (om een vals negatieve screening te vermijden). We screenen neus, keel en rectum dan opnieuw met een wisser. Pas wanneer we in drie opeenvolgende staalnames geen MRSA vinden, is de behandeling geslaagd.

Als u nog altijd drager bent, kunnen we eventueel een tweede dekolonisatiepoging ondernemen.

Waar let u op?

Bij irritatie of opzwellen van de slijmvliezen moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten. Verwittig uw behandelend arts of huisarts.

Nog vragen?

Als u nog vragen hebt over de behandeling of als er nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om uw behandelend arts of het team infectiepreventie te contacteren.

Contact

Infectiepreventie
T 09 224 63 04

artikel 21.833 | Laatste update: augustus 2021

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.