



ERCP

ERCP

Binnenkort ondergaat u een ERCP in AZ Sint-Lucas. Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt of als u belangrijke informatie bent vergeten doorgeven, kunt u ons contacteren via ons secretariaat (tel. 09 224 64 81).

Datum van het onderzoek:

.....


Naam van de arts die het onderzoek uitvoert:

.....

Wat is een ERCP?

ERCP staat voor Endoscopische Retrograde CholangioPancreaticografie. Het is een medisch onderzoek dat we voornamelijk gebruiken om problemen van de afvoer van gal of pancreassappen aan het licht te brengen en eventueel ook op te lossen. Het onderzoek gebeurt met een endoscoop. Dit is een flexibele lange slang met aan het uiteinde een camera die zo gericht is dat we de zijkant van de darm goed in beeld kunnen brengen. Door de endoscoop kunnen we verschillende instrumenten inbrengen. We brengen het toestel via de mond binnen.

1. Flexibele slang (endoscoop)
2. Slokdarm
3. Maag



Via de slokdarm en de maag passeert het naar de twaalfvingerige darm. Daar bevindt zich de papil van Vater. Dit is de uitmonding van het galkanaal (choledochus) en pancreasgang (wirsung) in de darm.

We kunnen contraststof inspuiten waardoor we röntgenfoto's kunnen nemen. Op die manier kunnen we bepaalde afwijkingen opsporen. We kunnen ook bepaalde interventies uitvoeren zoals het verbreden van de papil, het verwijderen van stenen of het plaatsen van een stent. Een stent is een plastic of metalen buisje dat we inbrengen om er bv. voor te zorgen dat de gal kan blijven afvloeien naar de darm. Vermits u tijdens het onderzoek verdoofd bent, kunnen zich bepaalde situaties voordoen waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming niet gevraagd kan worden. In zo'n situatie zal uw arts de beste en meest aangewezen beslissing nemen. Hij/zij houdt hierbij altijd rekening met alle gegevens die over u en uw ziekte toestand bekend zijn.


Na ieder onderzoek wordt de endoscoop zorgvuldig gereinigd en ontsmet volgens de geldende reglementeringen.

Risico's van het onderzoek

We hebben een ervaren team van artsen, verpleegkundigen en logistiek personeel en we zijn uitgerust met moderne infrastructuur. Toch houdt elke medische handeling, zelfs uitgevoerd in optimale omstandigheden, mogelijke risico's in. Die zijn uitzonderlijk, maar kunnen gepaard gaan met gevolgen waardoor een langer ziekenhuisverblijf noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een ontsteking van de pancreas, een nabloeding, een klein scheurtje, een infectie ...

Het onderzoek gebeurt onder algemene verdoving. Ook hier zijn risico's aan verbonden. Na de narcose kan misselijkheid optreden. Er bestaat ook een minimale kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie tijdens of na het onderzoek.

Complicaties kunnen zich ook soms voordoen wanneer u al thuis bent. De voornaamste symptomen zijn buikpijn, een grote hoeveelheid zwarte stoelgang of koorts. Als u één of meerdere van deze symptomen herkent, contacteer dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.



Vorbereiding van het onderzoek

Het is van essentieel belang dat u nuchter bent. **U moet minimaal 6 uur nuchter zijn voor voedsel en niet-heldere dranken.** De inname van heldere vloeistoffen (bv. water, appelsap, heldere sportdrank ...) moet u **minstens 3 uur voor het onderzoek stoppen.** Afhankelijk van uw leeftijd en medische voorgeschiedenis is er voordien ook een elektrocardiogram of longfoto nodig. Dit gebeurt in overleg met uw (huis)arts. Ook de medicatie die u inneemt overlopen we zorgvuldig.

Verloop van het onderzoek

We rijden u in uw bed binnen in de operatiezaal. Op uw vinger brengen we een saturatiemeter aan om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten en om de hartslag te volgen. Nadien krijgt u een zuurstofmasker op voor extra zuurstof tijdens het onderzoek. U krijgt een infuus om de verdovende medicatie te kunnen toedienen. Nadien valt u in slaap en beginnen we aan het onderzoek.

De duur van het onderzoek varieert, maar schommelt meestal rond de 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u wakker in de ontwaakkamer waar we u van nabij volgen. Als u voldoende wakker bent, brengen we u terug naar de kamer. Daar komt de arts langs om de resultaten van het onderzoek met u te bespreken. Over het algemeen blijft u één nacht in het ziekenhuis.

Wat brengt u mee?

- Identiteitskaart
- Kaart van de hospitalisatieverzekering (eventueel)
- De ingevulde vragenlijst van de dienst anesthesie
- Toestemmingsformulier met handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd"
- Comfortabele kledij
- Lijst van alle medicatie die u inneemt

Wat afleiding (lectuur, sudoku, breiwerk ...) kan leuk zijn omdat het wachten op het onderzoek lang kan lijken. Op de kamer is een tv aanwezig. Laat geld en juwelen thuis. Make-up, nagellak en piercings verwijdert u best thuis al.

Geneesmiddelengebruik en andere belangrijke medische gegevens

Verwittig uw arts minstens één week voor het onderzoek bij:

- Zwangerschap
- Gekende allergie
- Aanwezigheid van een kunsthartklep
- Bloedstollingsproblemen
- Het gebruik van bloedverdunders (o.m. Cardioaspirine®, Asaflow®, Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Brilique®, Ticlid®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Fragmin®, Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® ...)

Contact

Maag-, darm- en leverziekten

Straat 98

T 09 224 64 80 of 09 224 84 81

E secretariaat.gastroSL@azstlucas.be

Artsen

dr. Denis Marichal

prof. dr. Harald Peeters

dr. Bruno Waked

artikel 21.523 | Laatste update: oktober 2023

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.