

Afinitor® (= everolimus)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Bepaalde vormen van gevorderd niercelcarcinoom, een soort nierkanker.
- Hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. Het wordt gegeven in combinatie met de aromataseremmer exemestane (Aromasin®). Dit is een middel dat gebruikt wordt als hormoonbehandeling tegen kanker.
- Niet-operatief te verwijderen of gevorderde tumoren die van oorsprong uit de maag, darmen, longen of alveesklier komen.

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 10 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Afinitor® 10 mg).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven; volg altijd zijn/haar instructies.
- De voorgeschreven dosis moet continu eenmaal per dag ingenomen worden.
- Als u Afinitor® neemt ter behandeling van borstkanker, moet u ook dagelijks 1 tablet exemestane 25 mg innemen. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water, na de maaltijd.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. Kauw niet op de tablet en breek of plet ze niet.
- Als u het moeilijk hebt met het slikken van de tablet of u hebt last van aften, neem de tablet dan in met confituur.
- Neem de tabletten altijd in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- De tabletten moeten consequent ofwel met voedsel, ofwel zonder voedsel ingenomen worden.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel altijd op de correcte manier wordt ingenomen. Als u een dosis bent vergeten innemen, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Afinitor®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Ontsteking van de longen gekenmerkt door hoesten, koorts, kortademigheid, fluitende ademhaling. Contacteer uw arts als symptomen verergeren of optreden.
- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Bloedarmoede (= anemie): een tekort aan rode bloedcellen.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Hyperglycemie: hoge hoeveelheid suiker in het bloed.
- Hoge hoeveelheid vetten en cholesterol in het bloed.
- Aften en ontsteking van de mond.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust of verstoorde smaak.

- Oedeem: opstapelen van vocht.
- Huiduitslag, droge huid, jeuk.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pompoemes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pompoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De tabletten moeten in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden.
- Breng de overgebleven tabletten altijd terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen als u vermoeid bent.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Vrouwen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens en tot 8 weken na de behandeling. Mannen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens en tot 4 weken na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 2 weken na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.