

Cabometyx® (= cabozantinib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Gevorderde stadia van een soort nierkanker, niercelcarcinoom genaamd.

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 60 mg eenmaal daags (1 tablet Cabometyx® 60 mg 1x/dag)
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. Kauw niet op de tablet, plet of breek de tablet niet.
- Nuchter innemen (minstens 1u voor het eten of minstens 2u na het eten): elke dag op hetzelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: als er nog 12 uur of meer zijn voor uw volgende dosis, neem de gemiste dosis in van zodra u eraan denkt en neem de volgende geplande dosis op de normale tijd in. Als uw volgende geplande dosis binnen minder dan 12 uur moet worden ingenomen, neem de gemiste dosis dan niet in en neem uw volgende geplande dosis op de normale tijd in.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Bloedarmoede (= anemie): een tekort aan rode bloedcellen.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Maagproblemen: misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust, smaakverandering
- Diarree, verstopping (obstipatie)
- Hoge bloeddruk (hypertensie): zeker in het begin van de behandeling de bloeddruk tweemaal daags meten en noteren in dagboekje.
- Verlenging van het QT-interval wat tot hartritmestoornissen (versnelde of abnormale hartslag): arts laat ECG (hartfilmpje) bij start van de behandeling nemen
- Blaren, pijn aan de handen of voetzolen, uitslag of roodheid van de huid.
- Leverfunctiestoornissen
- Bloedingen
- Proteïnurie: eiwit in de urine (gezien in onderzoeken)
- Zwelling in uw benen en armen
- Pijn in armen, benen en gewrichten, spierkrampen
- Verandering in de bloedonderzoeken die worden gebruikt om de algemene gezondheid en functie van uw organen te controleren (inclusief de lever en de nieren), lage elektrolytenspiegels (zoals magnesium, calcium of kalium)

- Verminderde schildklieractiviteit; symptomen kunnen omvatten: vermoeidheid, gewichtstoename, verstopping (obstipatie), koudegevoel, en droge huid
- Haaruitval
- Vermoeidheid

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pomelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pomelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van Sint-Janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u zich vermoeid of zwak voelt.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Geschikte voorbehoedsmiddelen moeten gebruikt worden door zowel mannelijke en vrouwelijke patiënten én hun partners: tijdens en gedurende tenminste 4 maanden na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling en gedurende 4 maand na voltooiing van de behandeling.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Haal bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.