

Glivec® (= imatinib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Het wordt gebruikt voor verschillende soorten bloedkanker:
 - > Chronische myeloïde leukemie (CML).
 - > Acute lymfoblastaire leukemie (ALL).
- Gastro-intestinale stromale tumor (GIST), een soort maagdarmkanker.

2. Doseringsschema

- **CML:** de standaarddosis is 400 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Glivec® 400 mg) of 600 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Glivec® 400 mg + 2 capsules Glivec® 100 mg), afhankelijk van uw toestand.
- **ALL:** de standaarddosis is 600 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Glivec® 400 mg + 2 capsules Glivec® 100 mg).
- **GIST:** de standaarddosis is 400 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Glivec® 400 mg).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis moet continu eenmaal per dag ingenomen worden. Indien uw arts een dosis van 800 mg per dag of hoger voorschrijft, dan moet deze dosis verdeeld worden over twee innames.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de capsules of de tabletten in hun geheel door met een glas water.
- Neem de tabletten/capsules steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- Neem de tabletten/capsules in bij de maaltijd, bij voorkeur bij de hoofdmaaltijd.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Glivec®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Opstapelen van vocht: oedeem.
- Vochtophoping rond de ogen.
- Pijnlijke en tranende ogen met eventueel wazig zicht.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust.
- Huiduitslag en jeuk.
- Spier- en gewrichtspijn.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Gebruik paracetamol (vb. Dafalgan®) enkel na overleg met uw arts.
- Eet geen pompoemes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pompoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten/capsules op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De tabletten/capsules moeten in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden.
- Breng de overgebleven tabletten/capsules steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten/capsules nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u problemen heeft met uw zicht of wanneer u duizelig of vermoeid bent.
- Vermijd blootstelling aan zon/UV-licht of gebruik zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik geschikte voorbehoedsmiddelen tijdens en tot 2 weken na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 1 maand na de behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.