

Kisqali® (= ribociclib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
- Het wordt samen met aromataseremmers (vb. letrozol) of fulvestrant gegeven. Dit zijn middelen die gebruikt worden als hormoonbehandeling tegen kanker.

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 600 mg per dag in 1 inname (= 3 tabletten Kisqali® 200 mg).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- Eén behandelingscyclus duurt 4 weken (28 dagen).
- Neem gedurende de eerste 3 weken de voorgeschreven dosis in (dag 1 t.e.m. dag 21).
- Hierna volgt een rustperiode van 7 dagen (dag 22 t.e.m. dag 28). Neem tijdens deze rustperiode **GEEN** Kisqali® in.
- Indien u dit samen met letrozol 2,5 mg neemt, moet u **letrozol wel dagelijks** innemen, **ook in de stopweek van Kisqali®**. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water, dit kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden.
- Indien u dit samen met fulvestrant gebruikt, krijgt u de eerste maand 3 keer een injectie met fulvestrant. Dit gebeurt op dag 1, dag 15 en dag 29 van de eerste behandelingscyclus. De volgende maanden krijgt u één injectie per maand.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Kauw niet op de tabletten, los de tabletten niet op en breek of plet ze niet.
- Neem de tabletten steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel ingenomen worden, bij voorkeur 's morgens.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Kisqali®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Bloedarmoede (= anemie): een tekort aan rode bloedcellen.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Verlenging van het QT-interval wat kan leiden tot hartritmestoornissen.
- Ontsteking van de mond en lippen.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust.
- Haaruitval.

- Huiduitslag en jeuk.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pompoemes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pompoessoep.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u vermoeid bent.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik geschikte voorbehoedsmiddelen tijdens en tot 3 weken na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 3 weken na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.