

Stivarga® (= regorafenib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Dikkedarmkanker.
- Gastro-intestinale stromale tumor (GIST), een soort maagdarmkanker.
- Hepatocellulair carcinoom, een vorm van leverkanker.

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 160 mg per dag in 1 inname (= 4 tabletten Stivarga® 40 mg).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- Eén behandelingscyclus duurt 4 weken (28 dagen).
- Neem gedurende de eerste 3 weken eenmaal daags de voorgeschreven dosis in (dag 1 t.e.m. dag 21).
- Hierna volgt een rustperiode van 7 dagen (dag 22 t.e.m. dag 28). Neem tijdens deze rustperiode **GEEN** Stivarga®.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Kauw niet op de tabletten, los de tabletten niet op en breek of plet ze niet.
- Neem de dosis telkens in op ongeveer hetzelfde tijdstip **na een vetarme maaltijd**, bij voorkeur na het ontbijt. (Vb. boterhammen met confituur en een tas koffie of thee; een portie ontbijtgranen met een glas magere melk en een banaan,...)
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen maar u denkt er dezelfde dag nog aan, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Indien u er pas de volgende dag aan denkt, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Stivarga®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Ontsteking van de mond.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Hand-voet huidreactie.
- Diarree.
- Verminderde eetlust.
- Hoge bloeddruk: controleer dagelijks uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Huiduitslag.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker

op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.

- Eet geen pomelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pomelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De tabletten moeten in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Controleer dagelijks uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u duizelig of vermoeid bent.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik geschikte voorbehoedsmiddelen tijdens en tot 8 weken na uw behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 2 weken na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.