

Sutent® (= sunitinib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Bepaalde vormen van gemetastaseerde niercelcarcinoom, een soort nierkanker.
- Gastro-intestinale stromale tumor (GIST), een soort maagdarmkanker.
- Pancreaskanker (= kanker van de alvleesklier).

2. Doseringsschema

Maagdarmkanker/nierkanker:

- De standaarddosis is 50 mg per dag in 1 inname (= 4 tabletten Sutent® 12,5 mg).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- Eén behandelingscyclus duurt 6 weken (42 dagen). Neem gedurende de eerste 4 weken de voorgeschreven dosis in (dag 1 t.e.m. dag 28). Hierna volgt een rustperiode van 2 weken (dag 29 t.e.m. dag 42). Neem tijdens deze rustperiode **GEEN** Sutent®.
- **OF** één behandelingscyclus duurt 3 weken (21 dagen). Neem gedurende de eerste 2 weken de voorgeschreven dosis in (dag 1 t.e.m. dag 14). Hierna volgt een rustperiode van 1 week (dag 15 t.e.m. dag 21). Neem tijdens deze rustperiode **GEEN** Sutent®.

Pancreaskanker:

- De standaarddosis is 37,5 mg per dag in 1 inname (= 3 tabletten Sutent® 12,5 mg). Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis moet continu eenmaal per dag ingenomen worden. Er wordt **geen rustperiode** ingelast.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Kauw niet op de tablet en breek of plet ze niet.
- Neem de tabletten steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. Indien u last heeft van misselijkheid, kan het helpen om de tabletten samen met de maaltijd in te nemen.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen maar u denkt er dezelfde dag nog aan, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Indien u er pas de volgende dag aan denkt, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Sutent®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Bloedarmoede (= anemie): een tekort aan rode bloedcellen.

- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Ontsteking van de mond.
- Hand-voet huidreactie.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust.
- Hoge bloeddruk: controleer 2 maal per dag uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Huid/haarverkleuring: dit is tijdelijk en zal na afloop van de therapie spontaan verdwijnen.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pomelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pomelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Controleer tweemaal daags uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u duizelig of vermoeid bent.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap. Mannen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens en tot 7 weken na de behandeling. Vrouwen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens en tot 4 weken na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 4 weken na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.