

Tafinlar®/Mekinist® (= dabrafenib/trametinib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Melanoom, een bepaald type huidkanker.
- Niet-kleincellig longkanker (NSCLC).

2. Doseringsschema

- De standaarddosis Tafinlar® is 150 mg 2 maal per dag (= 2 capsules Tafinlar® 75 mg, 2 maal per dag).
- De standaarddosis Mekinist® is 2 mg per dag in 1 inname (= 1 tablet Mekinist® 2 mg).
- Uw arts kan van beide geneesmiddelen een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis Tafinlar® moet continu tweemaal per dag ingenomen worden. De voorgeschreven dosis Mekinist® moet continu eenmaal per dag ingenomen worden.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten en capsules in hun geheel door met een glas water. Kauw niet op de tabletten en capsules, breek of plet zet niet, los de tabletten en capsules niet op en open de capsules niet.
- Neem de geneesmiddelen steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- Beide geneesmiddelen moeten nuchter ingenomen worden. Dit betekent minstens 1 uur voor het eten of minstens 2 uur na het eten.
- Tafinlar®: laat steeds 12 uur tussen beide innames.
- Mekinist®: neem deze dosis samen met ofwel de ochtenddosis ofwel de avonddosis van Tafinlar®.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Wanneer u een dosis Tafinlar® bent vergeten innemen maar u denkt hieraan binnen de 6 uur na het tijdstip waarop u de dosis normaal inneemt, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Indien meer dan 6 uur na het tijdstip waarop u de dosis normaal inneemt, dan moet u deze vergeten dosis overslaan.
- Wanneer u een dosis Mekinist® bent vergeten innemen maar u denkt hieraan binnen de 12 uur na het tijdstip waarop u de dosis normaal inneemt, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Indien meer dan 12 uur na het tijdstip waarop u de dosis normaal inneemt, dan moet u deze vergeten dosis overslaan.
- Meld een vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Tafinlar® en Mekinist®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Koorts en koude rillingen.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust.
- Hoge bloeddruk: controleer 1 keer per dag uw bloeddruk en noteer dit.
- Hoofdpijn.
- Hand-voetsyndroom.
- Huiduitslag en droge huid.

- Huidafwijkingen.
- Verlenging van het QT-interval wat tot hartritmestoornissen kan leiden.
- Spier- en gewrichtspijn.
- Oogontsteking.
- Verhoogde leverwaarden.
- Haarverlies.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pompelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pompelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar Tafinlar® op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Bewaar Mekinist® in de oorspronkelijke verpakking in de koelkast, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten of capsules steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten of capsules nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Controleer 1 keer per dag uw bloeddruk en noteer dit.
- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u problemen heeft met uw zicht of wanneer u zich zwak voelt of vermoeid bent.
- Vermijd blootstelling aan zon/UV-licht of gebruik zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.
- Gebruik beide geneesmiddelen niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik geschikte voorbehoedsmiddelen tijdens en tot 4 maanden na de behandeling.
- Indien u orale anticonceptie of een andere anticonceptiemethode met hormonen gebruikt, kunnen deze mogelijk minder werkzaam zijn door de inname van Tafinlar® en Mekinist®. Gebruik daarnaast ook een barrièremethode (vb. een condoom).
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 4 maanden na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.