

Tasigna® (= nilotinib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Het wordt gebruikt voor een bepaalde vorm van bloedkanker (leukemie):
 - > Chronische myeloïde leukemie (CML)

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is afhankelijk van de fase van de ziekte.
 - > 300 mg tweemaal per dag (= 2 tabletten Tasigna® 150 mg tweemaal per dag) bij nieuwe diagnose CML in chronische fase.
 - > 400 mg tweemaal per dag (= 2 tabletten Tasigna® 200 mg tweemaal per dag) bij CML in acceleratiefase of chronische fase.
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis moet continu tweemaal per dag ingenomen worden.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten in hun geheel door met glas water. Kauw niet op de tabletten, en breek of plet ze niet.
- Neem de tabletten steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- Neem de tabletten tweemaal per dag in. Laat steeds 12 uur tussen beide innames.
- Neem de capsules nuchter in. Dit betekent minstens 2 uur na het eten of minstens 1 uur voor het eten.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Tasigna®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Bloedarmoede (= anemie): een tekort aan rode bloedcellen.
- Trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Dit leidt tot een hoger risico op bloedingen.
- Huidaandoeningen: huiduitslag, droge huid, rode huid.
- Diarree of obstipatie.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust.
- Hoofdpijn.
- Spier- en/of gewrichtspijn.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Eet geen pomelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pomelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u wazig ziet of wanneer u duizelig of vermoeid bent.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap. Vrouwen moeten geschikte voorbehoedsmiddelen gebruiken tijdens en tot 14 dagen na de behandeling.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 14 dagen na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.