

Zydelig® (= idelalisib)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Het wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten bloedkanker:
 - > Chronische lymfatische leukemie (CLL),
 - > Folliculair lymfoom (FL).

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 150 mg tweemaal per dag (= 1 tablet Zydelig® 150 mg tweemaal per dag).
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis moet continu tweemaal per dag ingenomen worden.

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. Kauw niet op de tablet, breek of plet ze niet en los de tabletten niet op.
- Neem de tabletten steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- De tabletten moeten consequent ofwel met voedsel ofwel zonder voedsel ingenomen worden.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen maar u denkt hieraan binnen de 6 uur, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Indien u hier aan denkt na meer dan 6 uur, dan moet u de vergeten dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Zydelig®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Neutropenie: een daling van het aantal witte bloedcellen. Hierdoor is er een verhoogde vatbaarheid voor infecties wat gekenmerkt wordt door onder andere koorts, aanhoudende diarree of een branderig gevoel bij het plassen.
- Niet-infectieuze longontsteking: hoesten, kortademigheid, koorts.
- Pneumocystis jirovecii pneumonie (PJP) en cytomegalovirus (CMV).
- Diarree.
- Ontsteking van de darm.
- Leverfunctiestoornissen.
- Huiduitslag.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt

ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.

- Eet geen pomelmoes, bittere/zure sinaasappel en granaatappel.
- Drink geen pomelmoessap.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd blootstelling aan zon/UV-licht of gebruik zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.
- Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik geschikte voorbehoedsmiddelen tijdens en tot 1 maand na de behandeling.
- Indien u orale anticonceptie gebruikt, kunnen deze mogelijk minder werkzaam zijn door de inname van Zydelig®. Gebruik daarnaast ook een barrièremethode (vb. een condoom). Bespreek met de arts wat de beste anticonceptiemethoden zijn voor u en uw partner.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 1 maand na uw behandeling.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.