

Zytiga® (= abirateron)

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

- Prostaatkanker.

2. Doseringsschema

- De standaarddosis is 1000 mg (= 2 tabletten Zytiga® 500 mg) éénmaal daags.
- Uw arts kan een andere dosis voorschrijven, volg steeds de instructies van uw behandelende arts.
- De voorgeschreven dosis moet continu eenmaal per dag ingenomen worden.
- Afhankelijk van het type prostaatkanker zal u ook 5 of 10 mg prednison of prednisolon eenmaal per dag moeten innemen

3. Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Slik de tabletten in zijn geheel door met een glas water. Kauw niet op de tabletten en breek of plet ze niet.
- Neem de tabletten steeds in op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- Neem de tabletten nuchter in. Dit betekent minstens 2 uur na het eten of minstens 1 uur voor het eten.
- Het is belangrijk dat dit geneesmiddel steeds op de correcte manier wordt ingenomen. Indien u een dosis bent vergeten innemen, dan moet u deze dosis overslaan. Meld de vergeten dosis bij de volgende raadpleging aan uw arts en ROTS-apotheker.
- Neem **NOOIT** een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Bij braken vlak na de inname van Zytiga®, hoeft u uw dosis niet opnieuw in te nemen. Wacht met het innemen van een nieuwe dosis tot het volgende geplande tijdstip.

4. Bijwerkingen

- Hoge bloeddruk: controleer 2 maal per dag uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Voctophoping.
- Urineweginfectie.
- Verhoogd valrisico en fracturen.
- Diarree.
- Misselijkheid en braken.
- Verminderde eetlust of verstoorde smaak.
- Vermoeidheid.

5. Welke geneesmiddelen en voeding mag ik NIET innemen tijdens mijn behandeling?

- Door het gelijktijdig innemen van andere geneesmiddelen/voedingssupplementen of bepaalde voedingsmiddelen, kan de werking van één van de geneesmiddelen versterkt of verzwakt worden. Daarom is het belangrijk dat uw behandelende arts en ROTS-apotheker op de hoogte zijn van alle voedingssupplementen en geneesmiddelen die u neemt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kan krijgen. Start bovendien geen nieuwe geneesmiddelen op zonder overleg met uw arts.
- Gebruik geen middelen op basis van sint-janskruid (een kruidenbehandeling tegen depressie).

6. Hoe moet ik het geneesmiddel bewaren?

- Bewaar de tabletten op kamertemperatuur, buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De tabletten moeten in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden.
- Breng de overgebleven tabletten steeds terug mee naar het ziekenhuis. Spoel de tabletten nooit door via de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilbak.

7. Aandachtspunten

- Vermijd het rijden met de auto of andere voertuigen indien u vermoeid bent.
- Controleer tweemaal daags uw bloeddruk en noteer dit in uw dagboekje.
- Geschikte voorbehoedsmiddelen moeten gebruikt worden tijdens en tot 3 weken na de behandeling indien de partner nog zwanger kan worden.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw behandelende arts of ROTS-apotheker (09/224.54.98 of ROTS@azstlucas.be).

Deze fiche is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door de apotheek van AZ Sint-Lucas. Desondanks kan AZ Sint-Lucas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze fiche. De informatie op deze fiche is geen vervanging van een medisch consult of de bijsluiter, maar vormt een aanvulling daarop.