

Alecensa[®] (= alectinib)

1. Indicatie

- Eerstelijnsbehandeling van volwassenen patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).
- Behandeling van volwassen patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC, die reeds eerder behandeld werd met Xalkori[®] (= crizotinib).

2. Werkingsmechanisme

- Proteïnekinaseremmer: het remt de ALK- en RET-tyrosinekinasen, dit leidt tot inductie van apoptose.

3. Doseringsschema

- Standaarddosering: 600 mg 2x/dag (= 4 capsules Alecensa[®] 150 mg 2x/dag).
- Continu tweemaal per dag innemen.

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, oplossen of openen.
- Innemen bij de maaltijd, telkens op zelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: vergeten dosis innemen indien langer dan 6 uur tot de volgende dosis. Indien minder lang dan 6 uur, dosis overslaan.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Anemie
- Diarree
- Constipatie
- Nausea en braken
- Verminderde eetlust
- Oedeem
- Pneumonitis
- Leverfunctiestoornissen
- Bradycardie
- Huiduitslag/lichtgevoeligheid
- Myalgie en artralgie
- Visusstoornissen

6. Interacties

- Alecensa[®] = CYP3A4-substraat.
- Dosisaanpassing niet nodig bij de combinatie van **CYP3A4-inhibitoren of -inductoren**. Wel wordt gepaste controle aanbevolen bij gelijktijdig innemen van sterke inhibitoren of inductoren.
- Alecensa[®] = Pgp-inhibitor.

- Opgelet met **Pgp-substraten**, plasmaconcentratie van deze geneesmiddelen kan stijgen: vb. digoxine, dabigatran, everolimus, sirolimus, nilotinib, lapatinib en topotecan.
- De werking van **orale anticonceptiva** kan mogelijk verminderen.

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Niet autorijden indien vermoeid, duizelig, lage bloeddruk of vertraagde hartslag.
- Blootstelling aan zon/UV-licht vermijden en zonnecrème met hoge beschermingsfactor gebruiken.
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 3 maanden na de behandeling.
- Orale anticonceptie mogelijk minder werkzaam door de inname van Alecensa®. Bespreek beste anticonceptiemethoden met arts.
- Geen borstvoeding geven tijdens en tot 1 week na de behandeling.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.