

Erivedge® (= vismodegib)

1. Indicatie

- Gemetastaseerd basaalcelcarcinoom.
- Lokaal uitgebreid basaalcelcarcinoom dat ongeschikt is voor chirurgie of radiotherapie.

2. Werkingsmechanisme

- Via de Hedgehog-sigtaalroute worden 'Glioma-Associated Oncogene' (GLI)-transcriptiefactoren geactiveerd en Hedgehog-doelgenen geïnduceerd. Veel van deze genen zijn betrokken bij de proliferatie, de overleving en de differentiatie van tumorcellen. Vismodegib remt het 'smoothened' transmembraan eiwit (SMO), waardoor deze Hedgehog-sigtaalroute geblokkeerd wordt.

3. Doseringsschema

- Standaarddosis: 150 mg/dag in 1 inname (= 1 capsule Erivedge® 150 mg).
- Continu eenmaal per dag innemen.

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, oplossen of openen.
- Consequent met of zonder voedsel innemen, telkens op hetzelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: dosis overslaan.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Diarree
- Constipatie
- Nausea en braken
- Verminderde eetlust en gewichtsverlies
- Smaakverandering
- Myalgie en artralgie
- Alopecia
- Huiduitslag/pruritus
- Amenorroe
- Vermoeidheid

6. Interacties

- Erivedge® = geen klinisch relevante interacties.

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 24 maanden na de behandeling. Ook steeds barrièremethode (vb. condoom) gebruiken.
- Geen borstvoeding geven tijdens en tot 24 maanden na de behandeling.

- Bij mannen kan Erivedge® in het sperma terechtkomen tijdens en tot 2 maanden na de behandeling. Gebruik steeds een condoom en doneer geen sperma tijdens deze periode.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.