

Inlyta® (= axitinib)

1. Indicatie

- Gevorderd niercelcarcinoom (RCC), na eerdere behandeling met een immuun checkpoint inhibitor en/of VEGF-gerichte therapie
- Gevorderd niercelcarcinoom, in combinatie met avelumab of pembrolizumab

2. Werkingsmechanisme

- Proteïnekinaseremmer: het remt de activiteit van VEGFR-1, VEGFR-2 en VEGFR-3. Deze kinasen zijn betrokken bij de tumorgroei, neoangiogenese en de metastatische progressie.

3. Doseringsschema

- Standaarddosering: 5mg 2x/dag (= 1 tablet Inlyta® 5 mg 2x/dag).
- Continu tweemaal per dag innemen.

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, pletten of breken.
- Consequent met of zonder voedsel innemen, met ongeveer 12 uur tussen beide innames, telkens op zelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: dosis overslaan.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Anemie
- Trombocytopenie
- Hypertensie
- Stomatitis
- Diarree
- Constipatie
- Nausea en braken
- Verminderde eetlust
- Dysfonie
- Hand-voet syndroom
- Huiduitslag en droge huid
- Vertraagde wondheling
- Hemorragie
- Hypothyreoïdie
- Leverfunctiestoornissen
- Vermoeidheid

6. Interacties

- Inlyta® = CYP3A4-substraat.
- Vermijd gelijktijdige toediening van **sterke CYP3A4-inhibitoren**, plasmaconcentratie van Inlyta® kan stijgen: vb. clarithromycine, erythromycine, itraconazol, ketoconazol,

posaconazol, ritonavir, saquinaivir, pompelmoes/pompelmoessap/bittere of zure sinaasappel/granaatappel. Indien vermijden niet mogelijk, dosis Inlyta® aanpassen.

- Vermijd gelijktijdige toediening van **sterke CYP3A4-inductoren**, plasmaconcentratie van Inlyta® kan dalen: vb. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, sint-janskruid,... Indien vermijden niet mogelijk, dosis Inlyta® aanpassen.

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Tweemaal per dag bloeddruk controleren + noteren in dagboekje.
- Niet autorijden indien duizelig of vermoeid.
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 1 week na de behandeling.
- Geen borstvoeding geven tijdens en tot 2 weken na de behandeling.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.