

Tagrisso® (= osimertinib)

1. Indicatie

- Als monotherapie bij volwassenen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met EGFR-mutaties in eerstelijnsbehandeling.
- Als monotherapie bij volwassenen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR T790M-mutatie.

2. Werkingsmechanisme

- Proteïnekinaseremmer: remt irreversibel epidermale groeifactor receptoren (EGFR's) met mutaties zoals T790M, L858R, ... Dit leidt tot remming van de celgroei.

3. Doseringsschema

- Standaarddosis = 80 mg/dag in 1 inname. (= 1 tablet Tagrisso® 80 mg).
- Continu eenmaal per dag innemen.

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, breken of pletten.
- Bij slikproblemen: tablet in zijn geheel oplossen in glas plat water, regelmatig roeren, wacht tot tablet uiteengevallen is in kleine stukjes (lost niet volledig op). Drink daarna onmiddellijk leeg en spoel na.
- Consequent met of zonder voedsel innemen, telkens op zelfde tijdstip.
- Bij vergeten dosis: vergeten dosis innemen indien langer dan 12 uur tot volgende dosis. Indien minder lang dan 12 uur, dosis overslaan.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Neutropenie
- Trombocytopenie
- Interstitiële longaandoening
- Stomatitis
- Diarree
- Huid- en nagelproblemen: rash, droge huid, paronychia, pruritus
- Keratitis

6. Interacties

- Tagrisso® = CYP3A4-substraat.
- Vermijd gelijktijdige toediening van **sterke CYP3A4-inductoren**, plasmaconcentratie van Tagrisso® kan dalen: vb. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, sint-janskruid,...
- Opletten bij gelijktijdige toediening van **QT-verlengende geneesmiddelen**.

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Niet autorijden indien problemen met het zicht.
- Blootstelling aan zon/UV-licht vermijden.
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 2 maanden na behandeling voor vrouwen, tijdens en tot 4 maanden na de behandeling voor mannen.
- Orale anticonceptie mogelijks minder werkzaam door de inname van Tagrisso®. Bespreek beste anticonceptiemethoden met arts.
- Geen borstvoeding geven tijdens en tot 2 weken na de behandeling.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.