

Xtandi® (= enzalutamide)

1. Indicatie

- Niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC (castratieresistent prostaatcarcinoom).
- Gemetastaseerd CRPC die asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen van androgeendeprivatietherapie voor wie behandeling met chemotherapie nog niet klinisch geïndiceerd is.
- Gemetastaseerd CRPC bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel.

2. Werkingsmechanisme

- Krachtige remmer van androgeenreceptor-signalerings, het remt competitief de androgeenbinding aan androgeenreceptoren. Hierdoor wordt de groei van de tumorcellen tegengegaan.

3. Doseringsschema

- Standaarddosis = 160 mg (= 4 tabletten Xtandi® 40 mg) in 1 innamen.
- Continu eenmaal per dag innemen.

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, breken of pletten.
- Consequent met of zonder voedsel innemen, telkens op hetzelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: dosis overslaan, tenzij patiënt er de dag zelf nog aan denkt.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Neutropenie
- Anemie
- Hypertensie
- Droge huid
- Verhoogd valrisico en fracturen
- Hoofdpijn, onrustige benen
- Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES)
- Diarree
- Nausea en braken
- Verminderde eetlust of verstoorde smaak
- Vermoeidheid

6. Interacties

- Xtandi® = inductor van CYP3A, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, UGT, P-gp.
- De plasmaconcentratie van volgende geneesmiddelen kan dalen door gelijktijdige toediening met Xtandi®: fentanyl, claritromycine, doxycycline, carbamazepine, fenytoïne, warfarine, digoxine, bisoprolol, tacrolimus, omeprazol, atorvastatine.

- Vermijd gelijktijdige toediening van **QT-verlengende-geneesmiddelen** vb. ondansetron, amiodaron, clarithromycine, ciprofloxacine, azitromycine, ...

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Niet autorijden indien vermoeid of duizelig.
- 2x/dag bloeddruk controleren + noteren in dagboekje.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 3 maand na de behandeling indien de partner nog zwanger kan worden.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.