

Zytiga[®] (= abirateron)

1. Indicatie

- Nieuw gediagnosticeerde hoog-risico gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC), in combinatie met androgeendeprivatietherapie.
- Gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die asymptomatisch/licht symptomatisch zijn na falen van androgeendeprivatietherapie of wanneer chemotherapie nog niet kinisch geïndiceerd is.
- mCRPC bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel.

2. Werkingsmechanisme

- Krachtige remmer van de biosynthese van androgenen.

3. Doseringsschema

- Standaarddosering = 1000 mg (= 2 tabletten Zytiga[®] 500mg) in 1 inneming.
- Continu eenmaal per dag innemen.
- Associatie van prednison of prednisolon:
 - > mHSPC: 5 mg prednison of prednisolon 1x/dag
 - > mCRPC: 10 mg prednison of prednisolon 1x/dag

4. Gebruiksaanwijzingen

- In geheel doorslikken. Niet kauwen, breken of pletten.
- Nuchter innemen (minstens 2 uur na eten of minstens 1 uur voor eten), telkens op zelfde tijdstip.
- Bij een vergeten dosis: dosis overslaan.
- Bij braken: dosis niet opnieuw innemen. Nieuwe dosis innemen op volgende geplande tijdstip.

5. Neveneffecten

- Hypertensie
- Oedeem
- Urineweginfectie
- Verhoogd valrisico en fracturen
- Hypercholesterolemie
- Diarree
- Nausea en braken
- Verminderde eetlust of verstoorde smaak
- Vermoeidheid

6. Interacties

- Zytiga[®] = CYP3A4-substraat.
- Vermijd gelijktijdige toediening van **CYP3A4-inductoren**, plasmaconcentratie van Zytiga[®] kan dalen: vb. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine, sint-janskruid,...
- Zytiga[®] = CYP2D6-inhibitor.

- Opgelet bij gelijktijdige toediening van **CYP2D6-substraten met een nauwe therapeutische marge**: bv. metoprolol, propranolol, venlafaxine, codeïne, tramadol,...

7. Aandachtspunten voor patiënt

- Niet autorijden indien vermoeid of duizelig.
- 2x/dag bloeddruk controleren + noteren in dagboekje.
- Effectieve anticonceptie noodzakelijk: tijdens en tot 3 weken na de behandeling indien de partner nog zwanger kan worden.
- Gebruik geen pillendoos, laat geneesmiddel in oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
- De patiënt moet bij voorkeur zelf het geneesmiddel uit de verpakking halen.