

Uw behandeling

THERAPIEWIJZER

DOELGERICHTE THERAPIE

Uw behandeling bestaat uit de toediening van **daratumumab** (Darzalex®) in combinatie met **bortezomib** (Bortezomib EG®).

Daratumumab is een monoclonaal antilichaam dat zich bindt aan een specifiek eiwit op de kankercellen. Hierdoor wordt de groei van de kankercellen verstoord.

Bortezomib is een proteasoomremmer en behoort eveneens tot de doelgerichte behandelingen bij bepaalde vormen van kanker. Het verstoort de afbraak van eiwitten in de cel en remt zo de groei van kankercellen.

Belangrijk

Daratumumab verstoort de kruisproef (= bloedtest noodzakelijk bij bloedtransfusie). Een uitgebreide bloedgroepbepaling wordt bij u afgenomen voor de aanvang van de behandeling. U ontvangt een kaartje met vermelding van uw behandeling en bloedgroep. Dit kaartje moet u bij zich dragen tot 6 maanden na de laatste toediening.

Ritme van uw behandeling

Daratumumab

Tijdens cyclus 1 t.e.m. 3 wordt daratumumab **wekelijks** toegediend. (d1, d8, d15)

Tijdens cyclus 4 t.e.m. 8 wordt daratumumab **3 wekelijks** toegediend. (d1)

Vanaf cyclus 9 wordt daratumumab **maandelijks** toegediend. (d1)

Bortezomib

Gedurende de **8 cycli** wordt bortezomib toegediend op d1, d4, d8 en d11, tenzij uw behandelend arts een ander ritme voorschrijft.

Aantal cyclussen: 8

Aantal dagen per cyclus: 21

	Week 1	Week 2	Week 3
CYCLUS 1 t/m 3			
Daratumumab	d1	d8	d15
Bortezomib	d1, d4	d8, d15	/
CYCLUS 4 t/m 8			
Daratumumab	d1	/	/
Bortezomib	d1, d4	d8, d11	/

Opmerkingen:

Premedicatie:

Dexamethasone: dosis en tijdstip inname wordt u meegedeeld door de arts



De volledige eerste cyclus wordt altijd **op het oncologisch dagziekenhuis** toegediend. In samenspraak met uw arts kan, vanaf de 2de cyclus, thuishospitalisatie worden voorzien.

De eerste dag van een nieuwe cyclus wordt u echter altijd verwacht op het dagziekenhuis. Dat betekent dat de eerste inspuiting per nieuwe cyclus op het dagziekenhuis wordt voorzien, in combinatie met een consultatie bij de arts.

Praktische afspraken

Daratumumab

- De flacon dient bewaard te worden in een apart vakje in de **koelkast (2 - 8 °C)**. De gesealde verpakking waarin een flacon zit mag **ENKEL** geopend worden door de thuisverpleegkundige.
- De flacon(s) worden meegegeven vanop het dagziekenhuis oncologie in een koeltas met koelelement.
- Bij een volgende bezoek aan het ziekenhuis brengt u de **koeltas en het koelelement** terug mee. Het koelelement hoeft niet diepgevroren te zijn.
- De flacon mag niet geschud worden.
- Laat de flacon voor toediening op kamertemperatuur komen (+/- 30 min – te bespreken met de thuisverpleegkundige.
- Eenmaal het product uit de koelkast is genomen, kan het maximaal 24h bewaard worden en nooit boven een temperatuur van 30 graden Celsius. Het mag ook **NOOIT OPNIEUW** in de koelkast gelegd worden.
- Het meegeleverde materiaal wordt bewaard op kamertemperatuur, niet in de koelkast.

Bortezomib

- Bortezomib spuit(en) worden bereid in de **ziekenhuisapothek**.
- De spuiten moeten **afgeschermd van licht bewaard worden in de koelkast (2 - 8°C)**. In die omstandigheden zijn de spuiten 28 dagen houdbaar. Op het etiket staat de bereidingsdatum en de houdbaarheid.
- De spuiten worden meegegeven vanuit het dagziekenhuis oncologie in een koeltas. Elke spuit zit apart verpakt in een gesealde zak met daarop de toedieningsdatum. Deze verpakking mag **ENKEL** geopend worden door de thuisverpleegkundige.
- Plaats de inhoud van de koeltas in een **apart vakje in de koelkast**.
- De verpakking wordt niet geopend.
- Het koelelement blijft in de koeltas zitten. Bij een **volgende bezoek** aan het ziekenhuis brengt u de **koeltas en het koelelement** terug mee. Het koelelement hoeft niet diepgevroren te zijn.
- Laat de spuit voor toediening op kamertemperatuur komen (+/- 15 min – overleg met thuisverpleegkundige).
! Let erop dat de spuit met de correcte toedieningsdatum uit de koelkast wordt gehaald

Toediening

De toedieningen gebeuren subcutaan (= onderhuidse inspuiting).

Premedicatie: Het is belangrijk uw premedicatie 1 uur voor elke injectie daratumumab in te nemen! Meld het zeker aan de thuisverpleegkundige indien je deze niet of te laat hebt ingenomen. Voor elke toediening controleert de thuisverpleegkundige een aantal parameters en klachten.

Geef het aan je (thuis)verpleegkundige door als je last hebt van een van de volgende klachten:

- Koorts en /of koude rillingen
- Ernstige gevoelloosheid, tintelingen, branderig of koud gevoel in je handen of voeten, met pijn of belemmering in je dagelijkse activiteiten
- Je algemeen onwel voelen
- Hoge of onregelmatige hartslag

Mogelijke nevenwerkingen

- Lokale reacties: verkleuring van de huid in een zone van 2-3cm rond de injectieplaats, gaat meestal vanzelf over.
- Hematologisch: myelosuppressie en verhoogd infectierisico
- Neurologisch: hoofdpijn, tintelingen/voosheid thv vingers/tenen
- Gastro-intestinaal: anorexie, nausea, constipatie
- Cardiovasculair: orthostatische hypotensie
- Andere: vermoeidheid

Tips

- Let op met vitamine C en groene thee: hoge dosissen kunnen de werking van bortezomib verminderen.
- Voorkom wrijving op de injectieplaats: draag losse kleding en vermijd wrijving op de plaats onmiddellijk na injectie.
- Bij jeuk of ongemak: neem altijd contact op met je huisarts of behandelende arts.

Contacteer uw (huis)arts wanneer ...

- Uw temperatuur boven 38°C gaat
- Bij jeuk of rode harde zone ter hoogte van injectieplaats

