

Uw behandeling

THERAPIEWIJZER

DOELGERICHTE THERAPIE

Uw behandeling bestaat uit de toediening van **Daratumumab** (Darzalex®), al dan niet in combinatie met andere medicijnen.

Daratumumab is een monoclonaal antilichaam dat zich bindt aan een specifiek eiwit op de kankercellen. Hierdoor wordt de groei van de kankercellen verstoord.

Belangrijk

Daratumumab verstoort de kruisproef (=bloedtest noodzakelijk bij bloedtransfusie). Een uitgebreide bloedgroepbepaling wordt bij u afgenomen voor de aanvang van de behandeling. U ontvangt een kaartje met vermelding van uw behandeling en bloedgroep. Dit kaartje moet u bij zich dragen tot 6 maanden na de laatste toediening.

Ritme van uw behandeling

Tijdens cyclus 1 en 2 wordt daratumumab **wekelijks** toegediend. (d1, d8, d15, d22)

Tijdens cyclus 3, 4, 5 en 6 wordt daratumumab **2 wekelijks** toegediend. (d1, d15)

Vanaf cyclus 7 wordt daratumumab **maandelijks** toegediend. (d1)

	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
Aantal cyclussen: /				
Aantal dagen per cyclus: 28				
cyclus 1 en 2	d1	d8	d15	d22
cyclus 3,4,5 en 6	d1	/	d15	/
vanaf cyclus 7	d1	/	/	/

De volledige eerste cyclus (bestaande uit 4 inspuitingen) wordt altijd **op het oncologisch dagziekenhuis** toegediend. In samenspraak met uw arts kan, vanaf de 2de cyclus, thuishospitalisatie worden voorzien.

De eerste dag van een nieuwe cyclus wordt u verwacht op het dagziekenhuis. Dat betekent dat de eerste inspuiting per nieuwe cyclus op het dagziekenhuis wordt voorzien, in combinatie met een consultatie bij de arts.

Praktische afspraken

- De flacon dient bewaard te worden in een apart vakje in de **koelkast (2 - 8 °C)**. De gesealde verpakking waarin een flacon zit mag ENKEL geopend worden door de thuisverpleegkundige.
- De flacon(s) worden meegegeven vanop het dagziekenhuis oncologie in een koeltas met koelement.



- Bij een volgende bezoek aan het ziekenhuis brengt u de **koeltas en het koelement** terug mee. Het koelement hoeft niet diepgevroren te zijn.
- De flacon mag niet geschud worden.
- Laat de flacon voor toediening op kamertemperatuur komen (+/- 30 min – te bespreken met de thuisverpleegkundige.
- Eenmaal het product uit de koelkast is genomen, kan het maximaal 24h bewaard worden en nooit boven een temperatuur van 30 graden Celsius. Het mag ook **NOOIT OPNIEUW** in de koelkast gelegd worden.
- Het meegeleverde materiaal wordt bewaard op kamertemperatuur, niet in de koelkast.

Toediening

De toediening gebeurt subcutaan (= onderhuidse inspuiting).

Premedicatie: Het is belangrijk uw premedicatie 1 uur voor elke injectie daratumumab in te nemen! Meld het zeker aan de thuisverpleegkundige indien je deze niet of te laat hebt ingenomen. Voor elke toediening controleert de thuisverpleegkundige een aantal parameters en klachten.

Geef het aan je (thuis)verpleegkundige door als je last hebt van een van de volgende klachten:

- Koorts en/of koude rillingen
- Je algemeen onwel voelen
- Hoge of onregelmatige hartslag

Mogelijke nevenwerkingen

- Lokale reacties: verkleuring van de huid in een zone van 2-3cm rond de injectieplaats, gaat meestal vanzelf over.
- Hematologisch: myelosuppressie en verhoogd infectierisico
- Neurologisch: hoofdpijn, tintelingen/voosheid thv vingers/tenen
- Gastro-intestinaal: anorexie, nausea, constipatie
- Cardiovasculair: orthostatische hypotensie
- Andere: vermoeidheid

Contacteer uw (huis)arts wanneer ...

- Uw temperatuur boven 38°C gaat
- Bij jeuk of rode harde zone ter hoogte van injectieplaats